



Pythagoras & Trigonometri



Indhold

Indholdsfortegnelse

Pythagoras	3
Retvinklet trekant	4
Bevis for Pythagoras' sætning	5
Opgaver med Pythagoras' sætning	6
Vinkelsummen i en trekant	9
Lignedannede trekanter	10
Enhedscirklen	12
Trigonometriske formler	13
Opgaver til trigonometriske formler	15



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}$$

$$\cos(A) = \frac{a}{c}$$

- Prestruktural
- Unistruktural
- Multistrukturel
- Relationel

Jeg kan regne med kvadrede tal og kvadratrødder.

Jeg ved, at der er en sammenhæng mellem vinklerne og sidelængderne i en retvinklet trekant.

Jeg kender formlerne, men er usikker i alt bruge dem til beregning af sider eller vinkler.

Jeg kender og kan bruge formlerne til at beregne alle manglende sidelængder og vinkler i en retvinklet trekant.

- Udvidet abstrakt

Jeg kan løse problemer med mere end en retvinklet trekant, hvor løsningen af den ene videreføres til beregning i den næste.

Før Efter

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pythagoras

Pythagoras fra Samos (Grækenland)

582 f.Kr. - 507 f.Kr.

Pythagoras var også filosof. Han forenede i sin lære matematik og talmystik med musik og forestillingen om sjælens udødelighed.

Pythagoras sætning angår forholdet mellem længden af siderne i en retvinklet trekant


- MEN i VIRKELIGHEDEN VAR DET SNYD!!!

Pythagoras har lagt navn til den pythagoræiske læresætning, men han opfandt den ikke.

Den var kendt i Babylon allerede ca. 1800 f.Kr.




PYTHAGORAS.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

Retvinklet trekant




Tegn en retvinklet trekant med kateterne $a = 3 \text{ cm}$ og $b = 4 \text{ cm}$. Mål c med en lineal. Beregn arealet af trekanten.

$$c = \underline{\hspace{5cm}} \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{Areal}_{\Delta} &= \frac{1}{2} \cdot h \cdot g \\ &= \underline{\hspace{5cm}} \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Tegn yderligere tre af disse trekanter, som vist på figuren.



Vi kan nu finde arealet af de fire små trekanter i det store kvadrat.

$$\text{Areal}_{4\Delta} = \underline{\hspace{5cm}} \text{ cm}^2$$

Vi finder dernæst arealet af hele det store kvadrat.

$$\text{Sidelængden} = \underline{\hspace{5cm}} \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{Areal}_{\square} &= l \cdot b \\ &= \underline{\hspace{5cm}} \text{ cm}^2 \end{aligned}$$


Vi kan nu finde arealet af det hvide kvadrat i midten.

$$\begin{aligned} \text{Areal}_{\diamond} &= \text{Areal}_{\square} - \text{Areal}_{4\Delta} \\ &= \underline{\hspace{5cm}} \text{ cm}^2 \end{aligned}$$


Til slut kan vi finde sidelængden c på det hvide kvadrat i midten.

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{\text{Areal}_{\diamond}} \\ &= \underline{\hspace{5cm}} \text{ cm} \end{aligned}$$

Bevis for Pythagoras' sætning



Tegn yderligere tre af disse trekanter, som vist på figuren



Arealet af hele det store kvadrat kan også beregnes som

$$\begin{aligned} \text{Areal}_{\square} &= (a+b) \cdot (a+b) \\ &= a^2 + a \cdot b + a \cdot b + \\ &\quad b^2 = a^2 + a \cdot b + a \cdot b + \\ &\quad + b^2 \\ &= a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2 \end{aligned}$$

Nu erstatter vi alle tallene med variablerne a , b og c . Arealet af trekanten er så:

$$\text{Areal}_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b$$

Arealet af de fire små trekanter i det store kvadrat kan så skrives som:

$$\begin{aligned} \text{Areal}_{4\Delta} &= 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \\ &= 2 \cdot a \cdot b \end{aligned}$$

Vi finder dernæst arealet af hele det store kvadrat som summen af de fire små trekanter og det hvide kvadrat i midten.

$$\begin{aligned} \text{Areal}_{\square} &= \text{Areal}_{\diamond} + \text{Areal}_{4\Delta} \\ &= c^2 + 2 \cdot a \cdot b \end{aligned}$$

De to arealer må selv sagt være det samme.


$$a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2 = c^2 + 2 \cdot a \cdot b$$

Herved fås Pythagoras' læresætning.

$$a^2 + b^2 = c^2$$


Opgaver med Pythagoras' sætning

Opgaver 1 – Pythagoras




$$x = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

Opgave 2 – Pythagoras




$$x = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

Opgaver 3 – Pythagoras




$$x = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

Opgaver 4 – Pythagoras




$$x = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

Opgaver 5 – Pythagoras



$$x = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

Opgaver 6 – Pythagoras




$$x = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

Opgaver med Pythagoras' sætning


Opgaver 7 – Pythagoras

- Den gamle Lillebæltsbro



Højde = 4 m

Afstand mellem de lodrette stivere = 5 m




Hvor lange er tværstiverne? _____ m

Opgave 8 – Pythagoras

- Drageflyvning

Dragens line er 50 m

Afstand mellem dreng og tårn = 45 m



Hvor højt er tårnet? _____ m

Opgaver 9 – Pythagoras

- Lyskæde til legehus


Gavlen på legehuset er 170 cm højt

Legehuset er 160 cm bredt



Hvor lang skal lyskæden være for at kunne sidde på gavlen af taget?

_____ m



Opgaver med Pythagoras' sætning


Opgaver 10 – Pythagoras

- Svævebane

Tårnet er 20 m højt

Afstanden over søen er 50 m

De to sider af søen er i niveau med hinanden.





Hvor lang er svævebanens kabel? _____ m

Opgave 11 – Pythagoras

- Pyramide

Pyramidens sidelængde er 230 m

Den skrål linje fra hvert hjørne er til toppen er 219 m




Hvor høj er pyramiden? _____ m

Opgaver 12 – Pythagoras

- Forsendelse med pakkepost

Kassens mål er 6 cm x 8 cm x 15 cm

Stokken er 20 cm




Kan stokken være i kassen? _____

Vinkelsummen i en trekant


Pythagoras' sætning er god til at finde sidelængderne i en retvinklet trekant. Men den kan intet sige os om vinklerne. Men kender vi bare den ene af de to ubekendte vinkler, kan vi let finde den anden, når vi ved, at trekanten er retvinklet.

Vi ved at vinkelsummen i en trekant altid er 180° .


Find alle tre vinkler i nedenstående trekanter.




$$B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$




$$A = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$




$$A = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$




$$A = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



$$A = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$




$$A = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$




$$A = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



$$B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



$$B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$



$$B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

Lignedannede trekantter


Pythagoras' sætning er god til at finde sidelængderne i en retvinklet trekant. Men den kan intet sige os om vinklerne. Vi kan på den måde ikke finde nogle af vinklerne eller afgøre om to trekantter er lignedannede alene ved hjælp af Pythagoras.

Lignedannede trekantter :

- Vi siger, at to **trekantter** er lignedannede, hvis deres vinkler er parvist lige store. Man kalder også de to trekantter for ensvinklede
- Lignedannede eller ensvinklede **trekantter** vil have samme form, og den eneste forskel på dem vil være, at den ene er i et eller andet størrelsesforhold til den anden.

Der er en sammenhæng mellem sidelængderne i en retvinklet trekant og de tilhørende vinkler. Her er indtegnet en given vinkel. Mål højden a og den dertilhørende hypotenuse for hver af de angivne trekantter (angivet med en stiplet linje).

NB: Vinkel A er ens på alle trekantterne.



$$\textcircled{1} \quad \frac{a}{c} = \frac{\text{_____}}{2} =$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{a}{c} = \frac{\text{_____}}{3} =$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{a}{c} = \frac{\text{_____}}{5} =$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{a}{c} = \frac{\text{_____}}{2} =$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{a}{c} = \frac{\text{_____}}{4} =$$


$$\textcircled{6} \quad \frac{a}{c} = \frac{\text{_____}}{6} =$$

Lignedannede trekantter

Der er åbenbart en sammenhæng mellem sidelængden a og hypotenusen i en retvinklet trekant og så den tilhørende vinkler.

Her er indtegnet den samme vinkel. Mål nu længden b og den dertilhørende hypotenuse for hver af de angivne trekantter (angivet med en stiplet linje).

$$A = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}$$



$$\textcircled{1} \quad \frac{b}{c} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{b}{c} = \underline{\hspace{2cm}} =$$


$$\textcircled{5} \quad \frac{b}{c} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{b}{c} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{b}{c} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{b}{c} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

Her er indtegnet den samme vinkel. Mål nu længden a og længden b for hver af de angivne trekantter.



$$\textcircled{1} \quad \frac{a}{b} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{a}{b} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{a}{b} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{a}{b} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{a}{b} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{a}{b} = \underline{\hspace{2cm}} =$$

Enhedscirklen



Nu lægger vi samme vinkel ind i et koordinatsystem.

Hvis vi kun ser på, hvad der sker i koordinatsystemet i en cirkel med en radius på 1 i forhold til koordinatsættet (0,0).

På y-aksen kan vi aflæse
 $\sin(30) = 0,5$


På x-aksen kan vi aflæse
 $\cos(30) = 0,8660$

På y-aksen kan vi, hvor
vinklen skærer tangenten
aflæse $\tan(30) = 0,5774$.



Trigonometriske formler

Mål sidelængderne for hver af trekantene. Beregn og aflæs $\sin(A)$, $\cos(A)$.
Sammenlign resultaterne.



$$A_{målt} = \underline{\hspace{2cm}} 80 \text{ } ^\circ$$

$$a_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$


$$c_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(A)_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(A)_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{a}{c} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{b}{c} = \underline{\hspace{2cm}}$$



$$A_{målt} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ } ^\circ$$

$$a_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$c_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(A)_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(A)_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{a}{c} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{b}{c} = \underline{\hspace{2cm}}$$



$$A_{målt} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ } ^\circ$$

$$a_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$c_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(A)_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(A)_{aflæst} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{a}{c} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{b}{c} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Trigonometrisk formler

Vi er nu nået frem til at følgende formler gælder for retvinklede trekanter.

$$\sin(A) = \frac{a}{c}$$

$$a = c \cdot \sin(A)$$

$$c = \frac{a}{\sin(A)}$$

$$\cos(A) = \frac{b}{c}$$

$$b = c \cdot \cos(A)$$

$$c = \frac{b}{\cos(A)}$$

$$\tan(A) = \frac{a}{b}$$

$$a = b \cdot \tan(A)$$

$$b = \frac{a}{\tan(A)}$$

$$\sin(B) = \frac{b}{c}$$

$$b = c \cdot \sin(B)$$

$$c = \frac{b}{\sin(B)}$$

$$\cos(B) = \frac{a}{c}$$


$$a = c \cdot \cos(B)$$

$$c = \frac{a}{\cos(B)}$$

$$\tan(B) = \frac{b}{a}$$

$$b = a \cdot \tan(B)$$

$$a = \frac{b}{\tan(B)}$$




Opgaver med trigonometriske formler

Det betyder, at får vi blot to yderligere informationer om en given retvinklet trekant, hvoraf mindst den ene er en sidelængde, kan vi beregne alle tre vinkler og alle tre sidelængder.

Vi kan bruge, at vinkelsummen i en trekant altid er 180° , Pythagoras' læresætning og de trigonometriske formler.

Løs nedenstående opgaver


Opgaver 1 – Trigonometri



$$c = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

$$\angle A = \underline{\hspace{2cm}} {}^\circ$$


Opgave 2 – Trigonometri



$$b = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

$$\angle A = \underline{\hspace{2cm}} {}^\circ$$


Opgaver 3 – Trigonometri



$$\angle A = \underline{\hspace{2cm}} {}^\circ$$

$$\angle B = \underline{\hspace{2cm}} {}^\circ$$


Opgaver 4 – Trigonometri



$$\angle A = \underline{\hspace{2cm}} {}^\circ$$

$$\angle B = \underline{\hspace{2cm}} {}^\circ$$

Opgaver 5 – Trigonometri



$$\angle B = \underline{\hspace{2cm}} {}^\circ$$

$$b = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$


Opgaver med trigonometriske formler

Opgaver 6 – Trigonometri

- Mandens højde

Længden fra mandens fødder til foreenden af surfboardet er 1,2 m

Hvor høj er manden? _____ m



Opgave 7 – Trigonometri

- Strandbuske

Afstanden mellem de to buske er 3,5 m

Hvor høj er busken til højre? _____ m



Opgaver 8 – Trigonometri


- Drageflyvning

Drenge holder fast i dragen 1 meter over jorden.

Linen er 25 meter.

Hvor højt over jorden flyver dragen?

_____ m



Opgaver med trigonometriske formler


Opgaver 9 – Trigonometri

- Telttur

Ved køb af telt medfølger
nedenstående tegning.



Hvor højt IDFI er teltet? _____ m



Hvor langt IEAI er teltet? _____ m

Opgave 10 – Trigonometri

- Straffespark

Afstanden mellem bold og midten af målet er 11 m

Målets bredde er 7,32 m

Målets højde er 2,44 m




Hvad er den største vinkel spilleren kan sparke i for at bolden sidder i hjørnet? _____
(Det antages at der sparkes så hårdt, at vi kan beskrive boldens bane som en ret linje) $^{\circ}$

Opgaver 11 – Trigonometri

- Kløft

Kløftens dybde er 250 m

Vinklen til modstående kløfts bund er $14,5^{\circ}$




Hvor bred er kløften? _____ m

Opgaver med trigonometriske formler

Opgaver 12 – Trigonometri

- Rundetårn

Bredden på gågaden foran Rundetårn er 11 m




Hvor højt er Rundetårn?

_____ m

Opgave 13 – Trigonometri

- Palme – lignedannede trekanter



Hvor høj er palmen?

_____ m


Opgaver 14 – Trigonometri

- Havdybde

Ankerlinen er 30 m

Der er 2 m fra ankerspillet og ned til havoverfladen.

Besætningen mäter vinklen på ankerlinen til 51° .



Hvad er havdybden på det pågældende sted?

_____ m

Opgaver med trigonometriske formler


Opgaver 15 – Trigonometri

- Gyng

Gyngestativet er 5,75 m højt

Rebet, der holder gyngen, er 5 m langt.

Pigen er 4 m fra gyngestativet.




Hvor højt over jorden gynger pige?

_____ m

Opgave 16 – Trigonometri

- Palmeøen



Hvor lang er den korteste afstand fra strandkanten ud til palmeøen?


_____ m

Opgaver 17 – Trigonometri

- Golfspilleren

En golfspiller kan slå 275 m med sin driver.

Han fejler sit drive med 2°



Hvor lang ligger bolden fra hullet?

_____ m


Opgaver med trigonometriske formler

Opgaver 18 – Trigonometri

- Sammensat figur

Find vinklen v i den øverste trekant.

Pas på med afrundinger i mellemregninger.




$$V = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}$$

Opgave 19 – Trigonometri

- Sammenset figur

Find sidelængden i den øverste trekant.

Pas på med afrundinger i beregninger.



$$\text{Sidelængden på den øverste trekant} = \underline{\hspace{2cm}}$$

cm